



FORTAP

GEL FORMICIDA INDOXACARBE



Tapinoma
Indústria e Comércio
de Desinfestante Ambientais Ltda.



FORTAP GEL FORMICIDA **INSETICIDA EFICAZ** NO CONTROLE DE **FORMIGAS**



www.tapinoma.com.br




[tapinoma_rc](https://www.instagram.com/tapinoma_rc)



FORTAP

GEL FORMICIDA INDOXACARBE

FORTAP GEL FORMICIDA INSETICIDA EFICAZ NO CONTROLE DE FORMIGAS



COMPOSIÇÃO: Indoxacarbe 0,050% p/p; Benzoato de Denatonium 0,0002% (Desnaturante); Solvente, Conservante e Atrativos.

APRESENTAÇÃO: Cartucho com 4 seringas de 30 g cada.

MODO DE USAR: Aplicação utilizando seringa da embalagem: Retire a tampa da seringa e coloque a agulha aplicadora e o êmbolo. Pressione levemente o êmbolo depositando gotas ou filetes do Fortap gel formicida, nos locais de infestação próximo às colônias, trilhas e onde as formigas forrageiam.

PRINCIPAIS LOCAIS DE APLICAÇÃO: Frestas, fendas, rachaduras, gavetas, armários, embaixo de pias e fogões, despensas, banheiros, instalações elétricas e eletrônicas.

DOSAGEM RECOMENDADA: 0,3 g/m² equivalente a 2 ou 3 pequenos filetes de 2 cm de comprimento cada.



PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSO SE INGERIDO OU ABSORVIDO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Usar luvas para aplicação do produto. Não há restrições quanto à reentrada após a aplicação do produto. Os restos de iscas podem ser removidos com o uso de detergentes, evitar o uso de solventes.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Em caso de derramamento isole e sinalize a área contaminada; recolha o material com auxílio de pá e coloque em recipiente lacrado e identificado; contate a empresa registrante. Desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases e efluentes aprovados por órgão competente. Descarte: as seringas devem ser embaladas, utilizando luvas e sacos para descarte de material e enviadas para incineração via distribuidor ou programa de reciclagem aprovado e credenciado. Consultar o órgão Estadual ou Municipal específico. Não queime nem entere as embalagens.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, local ventilado e previamente destinado a esta finalidade, evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Nome Comum: Indoxacarbe
Grupo Químico: Oxadiazina
Antídoto: Não há/tratamento sintomático
Telefone de emergência: (19) 3523-2217
Disque Intoxicação ANVISA
Renanciat: 0800 7226001



Tapinoma
Indústria e Comércio
de Desinfestante Ambientais Ltda.



www.tapinoma.com.br



[tapinoma_rc](https://www.instagram.com/tapinoma_rc)

Fabricado por:

**Tapinoma Indústria e Comércio de
Desinfestantes Ambientais LTDA.**

Av. 1 I.E. 367 - Distrito Industrial - Rio Claro/SP
CEP 13500-970 CNPJ 06.886.862/0001-40
Indústria Brasileira
e-mail: info@tapinoma.com.br

Registro no M.S. sob o 3.3428.0027.001-1
Responsável técnico: CRQ 0094499 - IV Região